

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente Placentex® "5.625 mg/3 ml soluzione iniettabile" Placentex® "2.25 mg/3 ml soluzione iniettabile" Polidesossiribonucleotide

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Placentex® e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Placentex®
3. Come usare Placentex®
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Placentex®
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Placentex® e a cosa serve

Placentex® è un medicinale a base di polidesossiribonucleotide, indicato per la riparazione di danni causati ai tessuti. Placentex® ha una attività cicatrizzante (è in grado di accelerare il processo di guarigione di ferite, ulcere e ustioni) e antidistrofica (attività riparativa di un danno a livello di un organo o tessuto).

Le fiale per via intramuscolare sono utilizzate quando si deve trattare un organo dall'interno e quindi si tratta di lesioni o ferite profonde (ulcere vascolari, diabetiche, decubiti).

2. Cosa deve sapere prima di usare Placentex®

Non usi Placentex®

Se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Placentex®.

In caso di allergia, il medico dovrà sospendere il trattamento con questo medicinale e, se del caso, instaurare una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

Altri medicinali e Placentex®

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati assieme a Placentex®.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Placentex® non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Placentex® "5.625 mg/3 ml soluzione iniettabile"

Placentex® "2.25 mg/3 ml soluzione iniettabile"

contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per dose, vale a dire che è un prodotto essenzialmente "privo di sodio".

3. Come usare Placentex®

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Placentex® "5.625 mg/3 ml soluzione iniettabile"

Placentex® "2.25 mg/3 ml soluzione iniettabile"

Una fiala al dì per via intramuscolare o sottocutanea, per cicli di 15-20 giorni, ripetibili, o secondo prescrizione medica.

Se usa più Placentex® di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Placentex® avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Placentex®

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco - Sito web: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Placentex®

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Placentex®

Placentex® "5.625 mg/3 ml soluzione iniettabile"

- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. Ogni fiala da 3 ml contiene 5,625 mg di polidesossiribonucleotide.

- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua p.p.i.

Placentex® "2.25 mg/3 ml soluzione iniettabile"

- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. Ogni fiala da 3 ml contiene 2,25 mg di polidesossiribonucleotide.

- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua p.p.i.

Descrizione dell'aspetto di Placentex® e contenuto della confezione

Placentex® "5.625 mg/3 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 3 ml

Placentex® "2.25 mg/3 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 3 ml

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Mastelli S.r.l. Via Bussana Vecchia n° 32 - 18038 Sanremo (IM) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 20 ottobre 2015

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

Placentex® "0.08% crema"

Placentex® "0.75 mg/3 ml soluzione cutanea"

Polidesossiribonucleotide – uso esterno

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Placentex® e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Placentex®
3. Come usare Placentex®
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Placentex®
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Placentex® e a cosa serve

Placentex® è un medicinale a base di polidesossiribonucleotide, indicato per la riparazione di danni causati ai tessuti. Placentex® ha una attività cicatrizzante (è in grado di accelerare il processo di guarigione di ferite, ulcere e ustioni) e antidistrofica (attività riparativa di un danno a livello di un organo o tessuto).

Sulla pelle è indicato per il trattamento di ferite e ulcere (come abrasioni, ustioni, ulcere vascolari, piaghe da decubito, ulcere diabetiche).

2. Cosa deve sapere prima di usare Placentex®

Non usi Placentex®

Se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Placentex®.

In caso di allergia, il medico dovrà sospendere il trattamento con questo medicinale e, se del caso, instaurare una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

Altri medicinali e Placentex®

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a Placentex®.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Placentex® non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Placentex® crema contiene lanolina, alcool cetilstearylco e alchil p-idrossi benzoati

Questo medicinale contiene lanolina ed alcool cetilstearylco che possono causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

Questo medicinale contiene alchil p-idrossi benzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare Placentex®

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Uso esterno, uso cutaneo

Placentex® "0.75 mg/3 ml soluzione cutanea" applicazioni locali 1 o 2 volte al dì, con garze sterili bagnate con la soluzione o secondo prescrizione medica.

Placentex® "0.08% crema" applicazioni locali una o due volte al dì o secondo prescrizione medica.

Se usa più Placentex® di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Placentex® avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Placentex®

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco - Sito web: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Placentex®

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Placentex®

Placentex® "0.08% crema"

- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. 100 g di crema contengono 80 mg di polidesossiribonucleotide.

- Gli altri componenti sono: esteri di acido oleico dell'alcol decilico, alcol cetilstearylco, lanolina anidra, alchil p-idrossi benzoati, imidazolidinilurea, base aromatica, acqua depurata.

Placentex® "0.75 mg/3 ml soluzione cutanea"

- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. Ogni fiala da 3 ml contiene 0,75 mg di polidesossiribonucleotide.

- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua p.p.i.

Descrizione dell'aspetto di Placentex® e contenuto della confezione

Placentex® "0.08% crema" - tubo da 25 g.

Placentex® "0.75 mg/3 ml soluzione cutanea" - 10 fiale da 3 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Mastelli S.r.l. Via Bussana Vecchia n° 32 - 18038 Sanremo (IM) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 20 ottobre 2015